

Tennant Minerals: Mächtige Abschnitte mit starker bis intensiver Kupfermineralisierung bei Bluebird

15.11.2023 | [IRW-Press](#)

- Bedeutsame Kupfermineralisierung bei Bluebird East, einer potenziellen Wiederholung der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird, durchschnitten - weitere Bohrungen werden folgen

- Stark mineralisierte Abschnitte in der jüngsten Bohrphase bei der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird, einschließlich unmittelbarer Erweiterungen und neuer Ziele auf einer erweiterten Streichlänge von 1,5 km (siehe Anhang 1 für Beschreibungen der Mineralisierung):

o Im Rahmen der Bohrungen in der außergewöhnlich hochgradigen Gold-Kupfer-Zone auf der Westseite von Bluebird wurden 63 m mit einer Hämatitalteration mit 48 m mit einer starken bis intensiven Kupfermineralisierung in BBDD0045 durchschnitten, einschließlich Zonen mit massivem Chalkopyrit (siehe Abb. 1, 2, 3).

o Im Rahmen der Bohrungen in den oberflächennahen östlichen Erweiterungen von Bluebird wurden mächtige Zonen mit einer Kupfermineralisierung durchschnitten, einschließlich 111 m mit einer Hämatitalteration mit 47 m mit einer starken Kupfer- und Bismutmineralisierung (Indikator für Gold) in BBDD0042 (siehe Abb. 1, 2, 4).

o Im Rahmen der Bohrungen beim Ziel Bluebird East wurde in BBDD0043 eine Zone von 24 m mit einer Chlorit-Siliziumdioxid-Hämatit-Alteration und einer Sulfidmineralisierung durchschnitten, einschließlich 8 m mit einer Kupfermineralisierung (Chalkosin, Malachit). Dieser Abschnitt ist insofern von großer Bedeutung, als er den oberen Teil einer Wiederholung der hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierungszone Bluebird darstellen könnte. Im Rahmen weiterer Bohrungen werden nun die Bereiche neigungsabwärts und westlich dieses Bohrlochs erprobt werden (siehe Abb. 1, 2, 5).

- Die neuen westlichen Abschnitte befinden sich in einem bis dato nicht bebohrten Abschnitt (448.300 mE) westlich der jüngsten Bonanza-Gold- und Kupferergebnisse (siehe Längsprojektion, Abb. 2), die Folgendes beinhalten:

17,95 m mit 11,08 g/t Au und 2,66 % Cu ab einer Bohrlochtiefe von 131 m in BBDD00261 einschließlich 15,9 m mit 12,45 g/t Au und 2,91 % Cu ab 131,8 m einschließlich 5 m mit 38,6 g/t Au und 6,11 % Cu ab 142,7 m, einschließlich 2,25 m mit 64 g/t Au und 9,57 % Cu

- Über 3.000 m an RC- und Diamantbohrungen wurden in dieser jüngsten Phase des Phase-3-Programms abgeschlossen, wobei die Analyseergebnisse der stark bis intensiv mineralisierten Bohrlöcher für Dezember/Januar erwartet werden.

Neville Basset, Chairman von Tennant Minerals, sagte:

Wir sind angesichts der visuellen Hinweise der jüngsten Bohrphase bei unserer hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird im Northern Territory äußerst zuversichtlich.

Wir haben nicht nur mächtige Abschnitte mit starker bis intensiver Kupfer- und möglicherweise Goldmineralisierung in der westlichen hochgradigen Gold-Kupfer-Zone bei Bluebird durchschnitten, sondern möglicherweise auch eine Wiederholung der hochgradigen Entdeckung Bluebird in Zusammenhang mit geophysikalischen Zielen bei Bluebird East entdeckt.

Die Identifizierung einer Wiederholung dieser außergewöhnlichen Entdeckung könnte das wirtschaftliche Potenzial von Bluebird, als hochgradige, separate Kupfer-Gold-Mine erschlossen zu werden, beträchtlich steigern.

15. November 2023 - [Tennant Minerals Ltd.](#) (Tennant oder das Unternehmen) (ASX: TMS) freut sich, stark

mineralisierte Abschnitte in mehreren Zielen der jüngsten Phase der Bohrungen bei der hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird bekannt zu geben, die sich innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Barkly, 40 km östlich von Tennant Creek im Northern Territory befindet (siehe Anhang 1 für Beschreibungen der Mineralisierung).

Vorsorglicher Hinweis hinsichtlich visueller Schätzungen:

In Zusammenhang mit der oben angegebenen Offenlegung der sichtbaren Mineralisierung wie im untenstehenden Text und in Anhang 1 detailliert beschrieben, weist das Unternehmen darauf hin, dass visuelle Schätzungen der Materialhäufigkeit von Oxid-, Carbonat- und Sulfidmineralisierungen niemals als Ersatz für Laboranalysen erachtet werden sollten. ICP-MS- und ICP-OES-Laboranalysen sind erforderlich, um die Mächtigkeiten und den Gehalt der Elemente (z. B. Kupfer, Cu) zu ermitteln, die mit der sichtbaren Mineralisierung in Zusammenhang stehen, die aus den vorläufigen geologischen Aufzeichnungen gemeldet wurde. Das Unternehmen wird den Markt auf dem Laufenden halten, sobald die Analyseergebnisse aus dem Labor eingetroffen sind und zusammengestellt wurden. Analyseergebnisse für die Mehrheit dieses Programms werden voraussichtlich innerhalb der nächsten 2-6 Wochen verfügbar sein. Die angepeilten Mineralhäufigkeiten werden zusammen mit allgemeinen geologischen Beschreibungen geschätzt.

Im September und Oktober wurden im Rahmen der zweiten Phase des Phase-3-Bohrprogramms bei Bluebird weitere 15 Reverse-Circulation- (RC)- und Diamantbohrlöcher auf knapp über 3.000 m gebohrt. Die Analyseergebnisse sind noch ausstehend, doch der Großteil der Ergebnisse wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 2-6 Wochen eintreffen.

Im Rahmen der aktuellen Bohrungen werden drei wesentliche Zielgebiete auf einem 1,5 km großen Gebiet bei Bluebird erprobt, einschließlich der oberflächennahen östlichen Erweiterungen der Kupfer-Gold-Mineralisierung, eines neuen Abschnitts in der außergewöhnlich hochgradigen Gold-Kupfer-Zone an der Westseite von Bluebird sowie erster Bohrlöcher im Zielgebiet Bluebird East. Die bis dato abgeschlossenen Bohrungen und die geplanten Bohrlöcher sind in der nachstehenden Abb. 1 mit einer Schwerkraftinversion dargestellt:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72664/Tennant_151123_DEPRcom.001.jpeg

Abb. 1: Bluebird in Planprojektion mit 3D-Schwerkraftinversionsmodell, aktuellem Programm und geplanten Bohrungen

In der jüngsten Bohrphase wurden in folgenden Gebieten stark mineralisierte Abschnitte vorgefunden:

i) Westliche hochgradige Gold-Kupfer-Zone bei Bluebird:

Die jüngsten Bohrungen umfassten zwei Bohrlöcher in der westlichen hochgradigen Gold-Kupfer-Zone bei Bluebird, auf einem zuvor nicht bebohrten Abschnitt, 448.300 mE (siehe Abb. 2 und Querschnitt, Abb. 3). Beide Bohrungen durchschnitten mächtige Zonen mit starker bis intensiver Kupfermineralisierung (siehe Anhang 1 für Beschreibungen der Mineralisierung):

- 63 m mit hämatitaleriertem Eisenstein mit 48 m mit starker bis intensiver Kupfermineralisierung, einschließlich massiver Chalkopyritabschnitte in BBDD0045 und oberhalb dieses Bohrlochs

- 47,5 m mit hämatitaleriertem Eisenstein mit 36 m starker bis intensiver Kupfermineralisierung, einschließlich Chalkopyrit, Chalkosin und nativem Kupfer in BBDD0046

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72664/Tennant_151123_DEPRcom.002.jpeg

Abb. 2: Längsprojektion von Bluebird mit wichtigen Kupfer-Gold-Abschnitten und neuen, stark mineralisierten Abschnitten in der Erweiterung von Bluebird, Zone East und West

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72664/Tennant_151123_DEPRcom.003.jpeg

Abb. 3: Querschnitt 448.300 mE mit neuen Bohrlöchern BBDD0045-46 mit Hämatit- und Kupferabschnitten

Diese neuen Abschnitte fallen in Richtung Westen des jüngsten außergewöhnlichen Gold- und Kupferabschnitts in BBDD00261 mit 17,95 m mit 11,08 g/t Au und 2,66 % Cu ab einer Bohrlochtiefe von 131 m ein, einschließlich 5 m mit 38,6 g/t Au und 6,11 % Cu. Die neuen Bohrlöcher haben auch die Zone der massiven Chalkopyrit-Sulfid-Mineralisierung westlich des vorherigen Bohrlochs BBDD00185 erweitert, das 30,5 m mit 6,2 % Cu und 6,8 g/t Au ab 153,6 m, einschließlich 17,8 m mit 5,2 % Cu und 11,5 g/t Au ab 153,6 m und 16,1 m mit 10,5 % Cu und 0,44 g/t Au ab 164,9 m, durchschnitt (siehe Längsprojektion, Abb. 2).

ii) Oberflächennahe östliche Erweiterungszone von Bluebird:

Neue Bohrungen zur Erweiterung der oberflächennahen, aufwärtsgerichteten östlichen Erweiterung von Bluebird haben die Beständigkeit bestätigt und die Mineralisierung auf geringere Tiefen erweitert. Zu den wesentlichen mineralisierten Abschnitten (siehe Anhang 1 für Beschreibungen der Mineralisierung) in Abschnitt 448.500 mE (siehe Abb. 2 und Querschnitt, Abb. 3) zählen folgende:

- BBDD0042, das 111 m mit einer Hämatit-Siliziumdioxid-Alteration der Eisensteinformation durchschnitt und 46,8 m einer starken Kupfermineralisierung (5 bis 30 % Kupferglanz, Bismutsulfide, geringe Mengen Bornit, Chalkopyrit und natives Kupfer) enthält

- BBRC0026, das 22,5 m mit einer Hämatitalteration durchschnitt, einschließlich 12,5 m Kupfermineralisierung (Kupferglanz, Bornit, natives Kupfer)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72664/Tennant_151123_DEPRcom.004.jpeg

Abb. 4: Querschnitt 448.500 mE, mit neuen stark mineralisierten Abschnitten in BBDD0042 und BBRC0026

Frühere bedeutsame Abschnitte in der östlichen Erweiterung sind in der Tiefe weiterhin offen und beinhalten 17,4 m mit 2,18 % Cu_{Äq}* (1,58 % Cu, 0,06 g/t Au und 0,25 % Bi) in BBDD00332 (siehe Abb. 2 und 4), einschließlich 5,44 m mit 3,66 % Cu und 0,1 g/t Au, einschließlich 3,2 m mit 1,62 % Cu, 0,08 g/t Au (* siehe Anhang 2 für Berechnungen des Kupferäquivalents (Cu_{Äq})).

Im Rahmen der neuen Bohrungen wurde die östliche Erweiterung der Mineralisierung bei Bluebird definiert und die Zone bis auf 60 m unterhalb der Oberfläche erweitert (siehe Abb. 4), was einen Tagebau zur Erschließung der Cu-Au-Zone bei Bluebird ermöglichen könnte.

iii) Ziel Bluebird East

Bohrungen, die übereinstimmende Schwereanomalien (Eisenstein) und Tiefstwerte der IP-Widerstandsfähigkeit 250 bis 500 m östlich der primären Entdeckung Bluebird anpeilten², 3, haben eine mächtige Eisenstein- und Hämatitalteration durchschnitt, einschließlich einer bedeutsamen Kupfermineralisierung (siehe Anhang 1 für Beschreibungen der Mineralisierung).

Das neue Diamantbohrloch BBDD0043 durchschnitt mächtigen Eisenstein in der modellierten Position und ging dann in eine 24 m umfassende Zone mit einer Hämatit-Chlorit-Siliziumdioxid-Alteration in einer Tiefe von 252,8 m über, die eine bedeutsame Kupfermineralisierung (sichtbarer Kupferglanz und Malachit auf Bruchflächen) auf 8 m aufweist (siehe Abb. 5).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72664/Tennant_151123_DEPRcom.005.jpeg

Abb. 5: Querschnitt 448.800 mE, Bluebird East, mit bedeutsamem Hämatit- und Kupferabschnitt in BBDD0042

Das Durchschneiden der Kupfermineralisierung im Liegenden des Eisensteins bei Bluebird East ist insofern von großer Bedeutung, als es auf die Entdeckung einer Wiederholung der hochgradigen Kupfer-Gold-Zone Bluebird hinweisen könnte. Im Rahmen weiterer Bohrungen werden nun die abwärtsgerichteten Erweiterungen dieser Zone erprobt, die sich in Richtung Westen erstrecken, wo der Eisenstein und die Mineralisierung laut Schwerkraft- und IP-Widerstandsmodellierung verlaufen (siehe Abb. 1 und 2).

Die potenzielle Entdeckung einer Wiederholung von Bluebird bei Bluebird East weist das Potenzial auf, das Profil der Kupfer-Gold-mineralisierten Zone zu verdoppeln (siehe Abb. 2).

NÄCHSTE SCHRITTE

Die Analyseergebnisse aller 15 Bohrlöcher, die im Rahmen dieser Bohrphase gebohrt wurden, sind noch ausstehend. Es ist davon auszugehen, dass die meisten dieser Ergebnisse innerhalb der nächsten 2-6 Wochen eintreffen werden.

Im Rahmen weiterer Bohrungen werden nun die abwärtsgerichteten Erweiterungen des Ziels Bluebird East (siehe Abb. 2) erprobt, ehe die Bohrungen vor der nördlichen Regenzeit abgeschlossen werden.

Andere Ziele, die noch erprobt werden müssen, sind die abwärtsgerichteten Erweiterungen der primären Kupfer-Gold-Zone sowie geophysikalische Ziele bei Bluebird West. Die Regierung des Northern Territory wird sich um eine Co-Finanzierung bemühen, um die tieferen und andere regionale Ziele wie Perseverance

North und Babler zu erproben (siehe Abb. 6).

Von den stark mineralisierten Bohrlöchern BBDD0045 und -0046, die den hochgradigen westlichen Teil der Lagerstätte Bluebird erprobten, werden metallurgische Großproben entnommen. Diese Arbeiten werden sowohl Flotationstests für die Sulfidmineralisierung als auch Schwerkrafttests für natives Kupfer und Gold umfassen.

Die Modellierung der Mineralressource wird nach dem Erhalt der Ergebnisse der aktuellen Phase durchgeführt werden.

ÜBER DAS PROJEKT BARKLY UND DIE KUPFER-GOLD-ENTDECKUNG BLUEBIRD

Die hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird befindet sich innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Barkly am östlichen Rand des reichhaltigen Mineralfelds Tennant Creek, das zwischen 1934 und 20056 über 5,5 Millionen oz Gold und über 700.000 t Kupfer produzierte (siehe Abbildung 6 unten).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72664/Tennant_151123_DEPRcom.006.jpeg

Abb. 6: Standort des Projekts Barkly und der wichtigsten historischen Minen im Mineralfeld Tennant Creek

Die bei Bluebird durchschnittene Mineralisierung ist typisch für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper im Mineralfeld Tennant Creek. Die hochgradige Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer intensiven Hämatitalteration und -brekziation mit sekundärem Malachit (Kupfercarbonat) in den oberen Bereichen sowie nativem Kupfer, das in der Tiefe in eine primäre Sulfidmineralisierung übergeht, einschließlich Kupferglanz, Bornit und Chalkopyrit.

Im Rahmen der bisherigen Bohrungen wurde eine Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Bluebird über eine Streichenlänge von 500 m und in einer Tiefe von über 250 m identifiziert. Die Mineralisierung bleibt vollständig in alle Richtungen offen (siehe Abbildung 2).

Das Unternehmen verfolgt einen doppelten Ansatz: einerseits das Ressourcenpotenzial der Entdeckung Bluebird zu definieren, andererseits andere wichtige Ziele innerhalb des Korridors Bluebird-Perseverance auf der Grundlage von Schwerkraft-, Magnetik- und IP-Widerstandsfähigkeitsmodellen zu testen⁷.

Tabelle 1: Einzelheiten zu den Bohrlöchern der Phase 3 bei Bluebird

Bohrloch-ID	Neigung°	Az Grid°	GRID	GRID_N	RL	Pre-0
BBDD0026	-60	0	448322	7827056	332	122,7
BBDD0027	-60	0	448280	7827060	332	101,5
BBDD0028	-65	0	448280	7827010	330	122,0
BBDD0028A	-67	352	448278	7827005	332	147,2
BBDD0029	-60	0	448280	7827085	332	71,8
BBDD0030	-60	357	448240	7827060	332	96,2
BBDD0031	-53	358	448320	7827060	332	-
BBDD0032	-53	0	448500	7827050	330	78,1
BBDD0033	-53	358	448500	7827010	332	71,6
BBDD0034	-53	357	448580	7827015	331	72,0
BBDD0035	-55.5	353	448580	7827035	332	29,5
BBDD0036	-54	359.5	448660	7827050	333	-
BBDD0037	-55	356.6	448660	7827032	331	51,1
BBDD0038	-55	0	448460	7827045	332	74,8
BBDD0039	-55.5	356.	448547	7827028	330	59,9
BBDD0040	-54.9	356	448980	7827002	330	80,7
BBDD0041	-51.5	356	448980	7827068	330	119,8
BBDD0042	-56.6	355	448500	7827030	330	66,0
BBDD0043	-51.2	355	448800	7827019	330	98,3
BBDD0044	-52.7	354	448200	7827025	330	144,0
BBDD0044A	-57.3	345	448200	7827020	330	143,0
BBDD0045	-79.5	357	448297	7827093	330	78,0
BBDD0046	-79.5	357	448297	7827033	330	78,0
BBRC0021	-52	359	448,321	7,827,079	331	150
BBRC0022	-54	356	448462	7827065	332	106,2
BBRC0023	-56.2	357	448579	7827052	332	174,0
BBRC0024	-50	357	448571	7827076	332	126,0
BBRC0025	-55	358	448615	7827085	332	126,0
BBRC0026	-50.5	0	448502	7827071	332	54,0
BBRC0027	-50.3	353	448540	7827066	332	126,0

Vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Bei Anfragen kontaktieren Sie bitte:

Tennant Minerals Ltd.

Stuart Usher, Company Secretary

M: +61 (0) 499 900 044

Andrew Rowell, White Noise Communications

M: +61 (0) 400 466 226

REFERENZEN

1 19/07/2023. *Tennant Minerals (ASX.TMS): Drilling Doubles Strike Length of Bluebird copper-Gold discovery*

2 15/08/2023 *Tennant Minerals (ASX.TMS): New Results Confirm Eastern Bluebird Extension Discovery*

3 15/05/2023. *Tennant Minerals (ASX.TMS): Drilling Resumes at high-Grade Bluebird Cu-Au Discovery*

4 01/9/2023 *Tennant Minerals (ASX.TMS): New Bluebird Drilling to Target Triple the Strike Length*

5 08/02/2023. *Tennant Minerals (ASX.TMS): Spectacular Bluebird Drill-Hit 30.5m @ 6.2% Cu, 6.8 g/t Au.*

6 Portergeo.com.au/database/mineinfo. *Tennant Creek - Gecko, Warrego, White Devil, Nobles Nob, Juno, Peko, Argo.*

7 25/08/2022. *Tennant Minerals (ASX. TMS): Standout Geophysical Targets to Replicate Bluebird Cu-Au*

Discovery.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von Rohstoff-Welt.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.rohstoff-welt.de/news/87944--Tennant-Minerals--Maechtige-Abschnitte-mit-starker-bis-intensiver-Kupfermineralisierung-bei-Bluebird.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by Rohstoff-Welt.de -1999-2026. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).